

REGENIN® S

Непрямой пептидный липолитик

НЕ «ОЧЕРЕДНОЙ ЛИПОЛИТИК», А ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС-АКТИВАТОР ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ЗАПУСКА ЛИПОЛИЗА

СОСТАВ ПРЕПАРАТА

Regentide® (sh-Oligopeptide-111 SP Amide)

основной активный ингредиент – высокоочищенный пептид нового поколения, стимулирующий липолиз

ЧИСТЫЙ СОСТАВ. ПРОСТАЯ ФОРМУЛА

- 1 пептид в составе Regentide® (sh-Oligopeptide-111 SP Amide) уникальная разработка компании Nine Biopharm
- минимальный риск осложнений и аллергических реакций
- поддержка окружающих тканей и сохранение эластичности кожи
- прогнозируемый результат

НЕ СОДЕРЖИТ: ФОСФАТИДИЛХОЛИН
И ДЕЗОКСИХОЛАТ НАТРИЯ,
РАЗРУШАЮЩИЕ ЖИРОВЫЕ КЛЕТКИ



REGENIN® S

ДЛЯ ТЕЛА

1 ФЛАКОН = 1 ЗОНА



РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА:

в ходе 1 процедуры рекомендуем использовать не более 20 – 30 мл препарата, в среднем расходуется 5 мл препарата на 200 см² – это 2 ладони, при каждой инъекции вводится по 0,1 мл в точку с интервалом 1 см.

КУРС: от 5 процедур с интервалом 14-20 дней.

ОБЛАСТЬ СЕДЬМОГО
ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА

ПЕРЕДНЯЯ БРЮШНАЯ
СТЕНКА

БОКОВЫЕ ВАЛИКИ
ЖИВОТА

ЗОНА ГАЛИФЕ

НАДКОЛЕННЫЕ ЗОНЫ



REGENIN® S

[для лица]

1 ФЛАКОН = 1 ЗОНА




РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА:

в ходе одной процедуры не более 10 мл препарата с учетом захвата субментальной области. По 0,05 мл на точку укола с шагом 0,5 см.

ИГЛЫ: любые с длиной более 2 мм, т. к. после этой глубины уже начинается ПЖК.

КУРС: от 3 процедур и более (при необходимости) с интервалом 7–10 дней.

ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ: брыли, второй подбородок, поднижнечелюстная зона, шея. (С малярными мешками липолитиком не рекомендуется работать)



ВВЕДЕНИЕ В ТОЧКУ ПО 0,05 МЛ
С ШАГОМ 0,5 СМ

ВВЕДЕНИЕ В ТОЧКУ ПО 0,05 МЛ
С ШАГОМ 0,5 СМ

ReGENIN[®]S

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ УЖЕ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ!

Карбышева Людмила Гаджиевна
к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог,
мед. советник бренда BiViDerma



ДО

ПОСЛЕ 5 НЕДЕЛЬ



**ЖЕНЩИНА 47 ЛЕТ,
ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК**

ReGENIN S: 5 мл

Интервал: 1 раз в 1-2 недели

Количество процедур: 5

Введение: колется в ПЖК – строго не дермально и не подкожно.
Игла 31G, 12-13 мм.

Вкол – 0,1 мл на один укол,
диффузия – 1,5-2 см.

ДО

ПОСЛЕ 5 НЕДЕЛЬ



**ЖЕНЩИНА 43 ГОДА,
ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК**

ReGENIN S: 5 мл

Интервал: 1 раз в 1-2 недели

Количество процедур: 5

Введение: колется в ПЖК – строго не дермально и не подкожно.
Игла 31G, 12-13 мм.

Вкол – 0,1 мл на один укол,
диффузия – 1,5-2 см.