



FAVORI

BY PERFOTESORO

# ПРОТОКОЛЫ

**FAVORI**  
**COLLAGEN SUPERLIFT**



# Точки лифтинга контура

**Техника постановки:** глубокие  
микроболюсы

**Глубина:** 4-6мм

**Угол введения:** 60°

**Инструмент:** игла 30G x 4мм


**Расход:** на вкол до 0,1мл

- лицо 1,5-2мл

**Интервал между процедурами:**

1р / 10-14 дней

**Курс:** 3-4 процедуры



# Контуринг лица

**Техника постановки:** бугорковая

**Глубина:** 3-4мм

**Угол введения:** 45-60°


**Инструмент:** игла 30G x 4мм

**Расход:** 2,5мл

**Интервал между процедурами:**

1р / 14-21 день

**Курс:** 3-4 процедуры



# Армирование с сепарацией

## Техника постановки:

линейно-ретроградно

**Глубина:** 4-6мм


Инструмент: канюля 25 x 50мм

**Расход:** 2,5-5мл

**Интервал между процедурами:**

1р / 14-21 день

**Курс:** 3-4 процедуры



# DMAE

## терапия


**ПТОЗ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА,  
ДРЯБЛОСТЬ КОЖИ**

(усиление адекватного мышечного сокращения)

### **Интрамускульные уколы**

- 0,1 мл на один укол, проходим  
снизу под платизмой

**Игла:** 30G - 6мм (12мм)




# DMAE терапия

ПОДНЯТИЕ БРОВИ

**Интрамускульные уколы**

- 0,1 мл на один укол

**Игла:** 30G - 6мм (12мм)



# DMAE

## терапия


### КОРРЕКЦИЯ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК

СХЕМА 1

**Введение препарата:** папульно  
(выполняется в три ряда до  
выдавливания носогубной  
складки)

- около 1 мл препарата

**Игла:** 30G - 4мм / 32G - 4мм



# DMAE

## терапия


### КОРРЕКЦИЯ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК

СХЕМА 2 (при нависании щеки)

**Введение препарата:** папульно

- 1я линия от крыла носа к козелку
- 5я линия от угла рта к мочке уха
- техника вколов под углом 45°
- около 1 мл препарата

**Игла:** 30G - 4мм / 32G - 4мм



# Протоколы по телу

## Push Up ягодицы

**Игла:** 30G/6

**Угол вкола:** 90°

**Расход:** по 2,5 мл на каждую сторону

**Шаг между вколами:** 1,5-2 см,  
на 1 вкол 0,1 мл

**Курс:** 4-5 процедур

**Интервал:** один раз в 3-4 недели



# Протоколы по телу

## Lift Up по телу

**Игла:** 30g/13 mm, слой субдермально

**Угол вкола:** 30°

**Расход:** в зависимости от количества векторов и зон коррекции

**Работа в веерной технике,** расстояние между линиями веера 0,7-0,8 мм


**Канюля:** 22g/70

**Шаг между вколами:** 1,5-2 см,

на 1 вектор 0,2 мл

**Курс:** 4-5 процедур

**Интервал:** один раз в 3-4 недели



# Протоколы по телу

## Коррекция стрий

**Игла:** 30g/13 mm, слой субдермально

**Угол вкола:** 30°

**Расход:** на 1 зону при площади покрытия «2 ладони» 5 мл (флакон). «1 ладонь» не менее 2,5 мл.

**Работа в веерной технике,** расстояние между линиями веера 0,7-0,8 мм


**Объем введения:** на 1 вектор 0,2 мл

**Канюля:** 22g/70

**Шаг между вколами:** 1,5-2 см,  
на 1 вектор 0,2 мл

**Курс:** 4-5 процедур

**Интервал:** один раз в 3-4 недели





**FAVORI**  
BY PERFOTESORO