ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ К ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Химический пилинг для профессионального использования на основе гиалуроновой кислоты с комплексом активных компонентов **ARTLINE® T34.**

НАЗНАЧЕНИЕ

Двухфазное средство (пилинг) с комплексом аминокислот и витаминов. Предназначен для применения в косметологии только специально обученным персоналом в условиях косметических кабинетов для эстетической коррекции небольших дефектов лица и тела за счёт удаления омертвевших клеток эпидермиса.

При использовании пилинга специалист должен учитывать анамнез пациента и сопутствующую патологию.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОЖИ

Продукт оптимален для нормальной, сухой, гиперпигментированной и возрастной кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для эстетической коррекции небольших дефектов лица и тела за счёт удаления омертвевших клеток эпидермиса в случаях:

- кератоза;
- нарушений рельефа кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Используя нитриловые перчатки, нанести раствор на предварительно очищенную и обезжиренную кожу массажными движениями до момента, когда перчатка перестанет скользить по поверхности. Процедуру допускается повторить не более 5 раз, затем смыть раствор водой. Нанести крем или маску для постпилингового ухода.

СОСТАВ

Трихлорацетат аммония, глицерин, койевая кислота, гидроксипропил-бета-циклодекстрин, перекись водорода, витамин С (аскорбат натрия), лаурет-7, витамин В3 (ниацинамид), глицин, пролин, аргинин, гидроксипролин, аммиак, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, динатрий ЭДТА, вода очищенная.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция на компоненты препарата;
- наличие активных воспалительных и инфекционных процессов, в том числе герпетической инфекции в стадии обострения, в зоне предполагаемого нанесения;
- нарушение целостности кожного покрова;
- приём препаратов, влияющих на регенерацию и чувствительность кожи;
- склонность к патологическому рубцеванию;
- беременность и период лактации;
- тяжелые хронические и системные заболевания в стадии декомпенсации;
- онкологические заболевания;
- возраст до 18 лет.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

До начала процедуры пациент должен быть проинформирован о возможных побочных реакциях. В редких случаях или с запозданием могут наступать следующие реакции:

- воспалительные реакции (покраснение, лёгкий отёк, активная форма герпеса), которые могут сопровождаться зудом, болью при надавливании. Эти реакции возникают после нанесения пилинга и могут длиться до семи дней (в случае с активной формой герпеса);
- аллергические реакции на компоненты препарата;
- обильное шелушение (в случае очень толстого рогового слоя);
- гиперемия, которая проявляется сразу после первого нанесения слоя пилинга (в случае гиперчувствительности кожи). В этом случае нужно ограничиться одним слоем пилинга;
- ощущение интенсивного жжения после нанесения (в случае, если кожа пациента реагирует на продукты, содержащие кислоты, интенсивным жжением);
- зуд с покраснением или без него в течение нескольких дней после применения пилинга (как правило, у людей с аллергией);
- ощущение сухости кожи;
- потемнение небольших участков кожи округлой формы в местах, где роговой слой толще. Появляются через несколько дней после процедуры, исчезают в процессе естественной эксфолиации.

Пациент должен быть проинформирован о необходимости сообщить врачу о любых побочных действиях, продолжающихся более одной недели. В таком случае врач может назначить пациенту соответствующее лечение. Следует сообщить уполномоченному представителю и/или непосредственно производителю обо всех нежелательных и побочных действиях, связанных с применением продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В случае попадания пилинга на слизистые оболочки необходимо место контакта промыть водой. Содержит перекись водорода. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза: немедленно тщательно прополоскать глаза водой, снять контактные линзы при их наличии, продолжать полоскание в течение нескольких минут.

Не использовать пилинг, если флакон открыт или повреждён. Не использовать пилинг после истечения срока годности, указанного на упаковке. Не смешивать с другими косметическими средствами, медицинскими изделиями или лекарственными препаратами.

Перед проведением процедуры следует прекратить приём иммунодепрессантов, ретиноидов, лекарственных препаратов, обладающих фотосенсибилизирующим действием.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +2°С до +8°С и относительной влажности 10–80% в защищённом от попадания прямых солнечных лучей месте, недоступном для детей. Не замораживать.

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителя: ООО «Айгеника Лаб», 129347, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ярославский, шоссе Ярославское, дом 146, корпус 2, помещение 300, тел.: +7(915)476-29-46.

Производитель: ООО «ФБК», 601622, Российская Федерация, Владимирская область, м. о. Александровский, д. Тириброво, ул. Центральная, д. 1А.

Изготовлено в России в соответствии с ГОСТ 31679-2012

Объем: 5 мл

Срок годности: 3 года с даты изготовления

СГР № RU.08.08.09.001.R.000621.09.26 от 02.09.2026 г.

