BEPHARM
профессиональная медицина

ПРОТОКОЛ

FAVORI COLLOPRIME

+7(495)125-12-15
WWW.BEPHARM.RU

ПРОТОКОЛ

Непосредственно перед процедурой необходимо гидратировать препарат 5 мл активатора и в течение 5 минут активно встряхивать до получения гомогенного инъекционного материала.

1. Обработка кожи антисептиком

2. Внутрикожное введение Collopreme в технике «плотной укладки». Инъекции выполняются частыми поверхностными микробугорками, расстояние между рядами и соседними инъекциями – не более 0,5 см, в области век – 2–3 мм. В области морщин/складок инъекции располагаются одна к одной, без промежутков. Возможно линейноретроградное введение. Размер игл в области глаз – 33G x 4mm; лицо, шея, декольте – 32G x 4mm.

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ:
Бугорковая, точечные инъекции, канюльная, веерная и диффузно-микробугорковая

3. Финишная обработка кожи антисептическим раствором

КУРС ПРОЦЕДУР

Рекомендуемый минимальный курс
3-5 процедур с промежутком между процедурами в 2-3 недели



x2-3

Поддерживающий курс
1 раз в 2-3 месяца

Длительность нахождения изделия в тканях составляет не менее 30 суток, зависит от индивидуальных физиологических особенностей организма пациента и не превышает 90 суток.

Максимально допустимая доза введения для одного пациента за одну процедуру составляет 25 мл гидратированного изделия (3 флакона).