



F E M E G Y L<sup>®</sup>

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

# БИОАКТИВ

НОВЫЙ ФОРМАТ РЕГИСТРАЦИИ

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

РУ № 2018/7271 ОТ 25.05.2020Г

ПОЛНЫЙ КУРС – 6-8 ПРОЦЕДУР  
С ИНТЕРВАЛОМ 7-10 ДНЕЙ

## МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ



### FEMEGYL<sup>®</sup> **M** БИОАКТИВ

- ✓ СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС
- ✓ УМЕНЬШЕНИЕ ВЫПАДЕНИЯ
- ✓ УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЛОС
- ✓ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ ГОЛОВЫ
- ✓ УСТРАНЕНИЕ ПЕРХОТИ И ЗУДА

#### СОСТАВ:

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, ГЕРМАНИЙ  
ОРГАНИЧЕСКИЙ ХЕЛАТНЫЙ КОМПЛЕКС С  
ГАММА-АМИНОМАСЛЯННОЙ КИСЛОТОЙ

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
- АКТИВАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В КЛЕТКАХ
- ПОДГОТОВКА КОЖИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ
- НАРУШЕНИЕ РОСТА И СТРУКТУРЫ ВОЛОС

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К КОМПОНЕНТАМ ПРЕПАРАТА
- ПЕРЕНЕСЕННЫЕ АУТОИММУННЫЕ БОЛЕЗНИ
- БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- НАЛИЧИЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ


ЗАПОЛНЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННОГО СОГЛАСИЯ  
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ  
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПОДТВЕРЖДЕНЫ  
КЛИНИЧЕСКИМИ  
ИССЛЕДОВАНИЯМИ

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
ТРЕБУЕТСЯ  
ПРОХОЖДЕНИЕ  
КУРСА



# МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА БИОАКТИВ



## ОБЛАСТЬ ВВЕДЕНИЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ (ВЫПОЛНЕНИЕ СОСУДИСТОГО ЭТАПА)



Игла 30G, 6-12 мм  
(в зависимости от выраженности ПЖК)

- Микроболюсно, на всю длину иглы
- Угол введения 90° к поверхности кожи
- 2-4 ряда вдоль позвоночного столба на расстоянии 2 и 4 см от остистых отростков
- Расстояние между вколами 1-1,5 см

ОБЪЕМ ВВОДИМОГО ПРЕПАРАТА 0,1-0,2 МЛ НА БОЛЮС

## ОБЛАСТЬ ВВЕДЕНИЯ МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ



Игла 30-32 G, 4 мм

- Интрадермально, микропапульно равномерно по всей поверхности
- Угол введения 45° к поверхности кожи
- Расстояние между вколами 1 см
- В очагах алопеции интрадермально, микропапульно на расстоянии 2-3 мм

ОБЪЕМ ВВОДИМОГО ПРЕПАРАТА 2-3 МЛ



## ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ:

ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО НАЧАЛА МЕЗОТЕРАПИИ НЕОБХОДИМО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИЕМА СОЛНЕЧНЫХ ВАНН И СОЛЯРИЯ, МИНИМИЗИРОВАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ, ПРЕКРАТИТЬ ПРИЕМ КРОВЕРАЗЖИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ:

- НЕ МЫТЬ ГОЛОВУ И НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОСМЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ВОЛОС В ТЕЧЕНИЕ 6-8 ЧАСОВ
- НЕ ОКРАШИВАТЬ ГОЛОВУ В ТЕЧЕНИЕ 1-2 ДНЕЙ (ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОСПАЛЕНИЙ И ПОКРАСНЕНИЙ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ)
- НЕ ПОСЕЩАТЬ БАНЮ, САУНУ, НЕ ПРИНИМАТЬ ГОРЯЧИЕ ВАННЫ И ДУШ, НЕ ПРОВОДИТЬ РАЗОГРЕВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ В ТЕЧЕНИЕ 2-3 ДНЕЙ
- НЕ ПРИНИМАТЬ ПРЕПАРАТЫ, РАЗЖИЖАЮЩИЕ КРОВЬ (ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОТЕКОВ И ГЕМАТОМ) ДО И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ В ТЕЧЕНИЕ 2-3 ДНЕЙ



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



F E M E G Y L®

# БИОЛИФТ

НОВЫЙ ФОРМАТ РЕГИСТРАЦИИ

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

РУ № 2018/7271 ОТ 25.05.2020Г

ПОЛНЫЙ КУРС – 6-8 ПРОЦЕДУР  
С ИНТЕРВАЛОМ 7-10 ДНЕЙ

## МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ

FEMEGYL® **R** БИОЛИФТ



- ✓ СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС
- ✓ УМЕНЬШЕНИЕ ВЫПАДЕНИЯ
- ✓ УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЛОС
- ✓ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ ГОЛОВЫ
- ✓ УСТРАНЕНИЕ ПЕРХОТИ И ЗУДА

### СОСТАВ:

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, ГЕРМАНИЙ  
ОРГАНИЧЕСКИЙ ХЕЛАТНЫЙ КОМПЛЕКС С  
ГАММА-АМИНОМАСЛЯННОЙ КИСЛОТОЙ

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
- ПОДГОТОВКА КОЖИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ
- НАРУШЕНИЕ РОСТА И СТРУКТУРЫ ВОЛОС
- АКТИВАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТОК КОЖИ


### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К КОМПОНЕНТАМ ПРЕПАРАТА
- ПЕРЕНЕСЕННЫЕ АУТОИММУННЫЕ БОЛЕЗНИ
- БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- НАЛИЧИЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ


ЗАПОЛНЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННОГО СОГЛАСИЯ  
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ  
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПОДТВЕРЖДЕНЫ  
КЛИНИЧЕСКИМИ  
ИССЛЕДОВАНИЯМИ

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
ТРЕБУЕТСЯ  
ПРОХОЖДЕНИЕ  
КУРСА



# МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА БИОЛИФТ



## ОБЛАСТЬ ВВЕДЕНИЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ (ВЫПОЛНЕНИЕ СОСУДИСТОГО ПРОТОКОЛА)



Игла 30G, 6-12 мм  
(в зависимости от выраженности ПЖК)

- Микроболюсно, на всю длину иглы
- Угол введения 90° к поверхности кожи
- 2-4 ряда вдоль позвоночного столба на расстоянии 2 и 4 см от остистых отростков
- Расстояние между вколами 1-1,5 см

ОБЪЕМ ВВОДИМОГО ПРЕПАРАТА 0,1-0,2 МЛ НА БОЛЮС

## ОБЛАСТЬ ВВЕДЕНИЯ МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ



Игла 30-32 G, 4 мм

- Интрадермально, микропапульно равномерно по всей поверхности
- Угол введения 45° к поверхности кожи
- Расстояние между вколами 1 см
- В очагах алопеции интрадермально, микропапульно на расстоянии 2-3 мм

ОБЪЕМ ВВОДИМОГО ПРЕПАРАТА 2-3 МЛ



## ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ:

ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО НАЧАЛА МЕЗОТЕРАПИИ НЕОБХОДИМО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИЕМА СОЛНЕЧНЫХ ВАНН И СОЛЯРИЯ, МИНИМИЗИРОВАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ, ПРЕКРАТИТЬ ПРИЕМ КРОВЕРАЗЖИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ:

- НЕ МЫТЬ ГОЛОВУ И НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОСМЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ВОЛОС В ТЕЧЕНИЕ 6-8 ЧАСОВ
- НЕ ОКРАШИВАТЬ ГОЛОВУ В ТЕЧЕНИЕ 1-2 ДНЕЙ (ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОСПАЛЕНИЙ И ПОКРАСНЕНИЙ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ)
- НЕ ПОСЕЩАТЬ БАНЮ, САУНУ, НЕ ПРИНИМАТЬ ГОРЯЧИЕ ВАННЫ И ДУШ, НЕ ПРОВОДИТЬ РАЗОГРЕВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ В ТЕЧЕНИЕ 2-3 ДНЕЙ
- НЕ ПРИНИМАТЬ ПРЕПАРАТЫ, РАЗЖИЖАЮЩИЕ КРОВЬ ( ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТЕКОВ И ГЕМАТОМ) ДО И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ В ТЕЧЕНИЕ 2-3 ДНЕЙ

